

## PROSPECT PRIMODOG

### 1. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE COMERCIALIZARE ȘI A DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE PRODUS, DACĂ SUNT DIFERITE

Merial, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Franța

### 2. DENUMIREA PRODUSULUI MEDICINAL VETERINAR

Primodog

### 3. DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Fiecare doză de vaccin conține:

Parvovirus canin atenuat ..... min  $10^{5,5}$  DICC<sub>50</sub> max  $10^{7,2}$  DICC<sub>50</sub>

Excipient, q.s. .... 1 ml

### 4. INDICAȚIE (INDICAȚII)

Imunizarea activă a câinilor împotriva parvovirozei.

### 5. CONTRAINDICAȚII

Nu există

### 6. REACȚII ADVERSE

Vaccinarea poate induce o stare de hipersensibilitate. În acest caz, trebuie administrat tratament simptomatic.

### 7. SPECII ȚINTĂ

Câini

### 8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE (CĂI) DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Administrare subcutanată.

Dozare: 1 ml conform următoarei scheme de vaccinare:

#### **Prima vaccinare:**

1 injecție la vârsta de 6 săptămâni, fie chiar în prezența anticorpilor maternali.

Primodog este compatibil și poate fi utilizat în combinație cu vaccinurile Bivirovax (DH) și Letodog (L).

Prima vaccinare trebuie efectuată, începând cu a 12-a săptămână de viață cu vaccinurile Merial monovalente sau polivalente care conțin componenta împotriva parvovirozei.

**Revaccinarea:**

O injecție împotriva parvovirozei la un an de la prima vaccinare. Ulterior, revaccinare la fiecare 2 ani.

**9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ**

A se agita înainte de utilizare.

A se aplica procedurile antiseptice obișnuite.

A se utiliza echipament de vaccinare steril și/sau fără urme de dezinfectant.

**10. TIMP DE AȘTEPTARE**

Nu se aplică

**11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la frigider (2 °C - 8 °C), protejat de lumină. A nu se congela.

**12. ATENȚIONARE (ATENȚIONĂRI) SPECIALĂ (SPECIALE)**

Se vor vaccina numai animalele perfect sănătoase, corect deparazitate cu cel puțin 10 zile înainte de vaccinare.

Se recomandă să nu fie supuși câinii la efort fizic prelungit până când nu se instalează starea de imunitate.

A se lua toate precauțiile obișnuite în manipularea femelelor gestante.

Nu a fost observat nici un efect advers după administrarea a 10 doze de vaccin.

**13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR, DUPĂ CAZ**

Medicamentele nu trebuie aruncate în ape reziduale sau resturi menajere.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

**14. DATE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL****15. ALTE INFORMAȚII**

Numai pentru uz veterinar.

Pentru informații detaliate despre acest produs, contactați reprezentantul local:  
VETECO INTERSERVICES S.R.L. – [www.veteco.com](http://www.veteco.com)